

Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre profesionálnych aj neprofesionálnych používateľov

MODRÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY

POUŽITIE V ZÁHRADÁCH A PREDZÁHRADKÁCH JE POVOLENÉ

Pomocný prostriedok slúži pre monitoring a signalizáciu náletu škodlivého hmyzu v skleníkoch a fóliovníkoch.

AKTÍVNA ZLOŽKA: *Polyolefíny*

100% hm. (180 g/kg)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:
nerelevantné

OZNAČENIE PRÍPRAVKU: nepožaduje sa
Výstražné slovo sa nepožaduje

- EUH 401** Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.
- P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
- P280 Noste ochranné rukavice a ochranný odev.
- SP1** Neznečisťujte vodu prostriedkom alebo jeho obalom. Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii vôd odtokových kanálov z fariem a ciest.
- Vč3** Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.
- V3** Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.
- V04** Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné organizmy prijateľné.
- Vt5** Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.
- Z4** Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!
Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

Držiteľ autorizácie:

bioTomal,
941 36 Rúbaň 291,
Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP: **07-20-0940**

Dátum výroby: uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže: uvedené na obale

Balenie: PE vrečko (po 3, 6, 24 ks doštičiek) v PAP krabici

PÔSOBENIE POMOCNÉHO PRÍPRAVKU

Zisťovanie škodcov: strapky – veľmi drobný hmyz, čiarkovitého tvaru tela, spravidla tmavej farby. Napadnuté časti rastlín sú striebřisté s čiernymi kvapôčkami trusu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka	Ochranná doba	Poznámka
rastliny v skleníkoch a fóliovníkoch	strapky	1 doštička na 2-4 m ² plochy		signalizácia výskytu a priama ochrana rastlín
rastliny v skleníkoch a fóliovníkoch	strapky	1 doštička na 10-200 m ² plochy		signalizácia výskytu

POKYNY PRE APLIKÁCIU

1. Na signalizáciu výskytu strapiek v skleníkoch, vo fóliovníkoch a na kontrolu účinnosti biologických či chemických ochranných zásahov proti nim. - Vyveste jednu doštičku na 10 - 200 m² plochy, v čase do jedného týždňa po výsadbe.
2. Na signalizáciu napadnutia a priamu ochranu rastlín pestovaných v skleníkoch, fóliovníkoch. - Vyveste na každé 2 - 4 m² plochy po jednej lepovej doštičke vo výške 10 cm nad rastlinami do jedného týždňa po výsadbe.

Tieto lapáky môžete použiť aj v kombinácii s ďalšími prostriedkami biologickej ochrany rastlín. Informujte sa na možnosti optimálnej ochrany u špecializovaných predajcov, alebo priamo u výrobcu.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Aplikácia pomocného prípravku nemá negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s pomocným prípravkom používajte vhodný ochranný odev a rukavice. Počas práce a po nej, až do umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.

PRVÁ POMOC

Po požití: Vypláchnuť ústa vodou. Nevyvolávať zvracanie. Nič nedávať jesť ani piť.

Postihnutého držať v pokoji a teple. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri zasiahnutí očí: vyplachovať prúdom čistej vody po dobu najmenej 15 minút. Pokiaľ pretrváva podráždenie, vyhľadať lekára.

Pri zasiahnutí pokožky: zasiahnuté miesta umyť teplou vodou a mydlom.

Pri nadýchaní: dopraviť postihnutého na čerstvý vzduch.

V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

V suchých, čistých, krytých skladoch, chrániť pred poveternostnými vplyvmi, pri teplotách +5° C až 25° C. Chránite pred mrazom, priamym slnečným svetlom a vlhkom. Pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených originálnych obaloch je doba použiteľnosti 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV

Nepoužitý prípravok v pôvodnom obale a prázdne obaly z prípravku odovzdajte v mieste zberu domového odpadu špeciálne vytvoreného pre tento účel (v rámci triedenia odpadov) príslušnou samosprávou (informujte sa u orgánu miestnej správy)! Obaly od prípravku sa nesmú znovu používať na akékoľvek iné účely!