

Produkty firmy Bacaro - www.bacaro.eu

Calmati

Symbiotický účinok pôdných baktérií a mykorrhízy indukuje v rastline ochranné mechanizmy proti hubovým chorobám ako sú **múčnatka**, **peronospóra**, **Botrytis cinerea**, **Alternaria**, **Puccinia**, **Venturia**, **Monilia**, **Nectria**.

Mykorrhíza vyvoláva v rastline stimuláciu zhrubnutia bunkovej steny, predĺženia koreňov, produkciu kalusu a lignínu, ako aj produkciu antioxidantov, ako sú fytoalexíny a polyfenoly, ktoré pomáhajú endogénnej obrane rastliny.

Najväčší význam produktu spočíva v aplikácii počas kvitnutia, kedy prípravok vytvorí na povrchu kvetov ochranný film, cez ktorý patogénny nedokážu preniknúť a napadnúť formujúce sa plody.

Formulácia : Kvapalina

Plodina	Dávka	Aplikácia
Ovocné dreviny, vinič	5 l / 1 000 l vody	Najdôležitejšia aplikácia je v čase kvitnutia, kedy je otvorených 75 % kvetov. Ďalšie aplikácie počas vegetácie v závislosti od výskytu chorôb.

Viac informácií
o produkte:



Effetto

Prípravok stimuluje symbiotické pôsobenie rhizosféry a baktérií mykorrhízy a vyvoláva aktiváciu obranných mechanizmov rastlín proti škodcom: **smúťivky**, **strapky**, **molice**, **mravce**, **bzdochy**, **dvojkridlovce**, **motýle**, **roztokoč**.

Mykorrhíza vyvoláva v rastline stimuláciu zhrubnutia bunkovej steny, predĺženia koreňov, produkciu kalusu a lignínu, ako aj produkciu antioxidantov, ako sú fytoalexíny a polyfenoly, ktoré pomáhajú endogénnej obrane rastliny.

Pre lepšiu účinnosť je dôležité zabezpečiť dokonalé pokrytie celej rastliny prípravkom.

Prípravok je vhodné použiť do pôdy skoro na jar, kedy napomáha eliminovať **väčšinu prezimujúcich škodcov v pôde**.

Formulácia : Kvapalina

Plodina	Škodca	Dávka	Aplikácia
Obilniny, kukurica, repa, zelenina, ovocné dreviny, vinič	Vajíčka a larvy smúťivky, strapky, molice, mravcov, bzdochy, motýľov, roztokočov	5 l / ha/ max. 1000 l vody	Ako prevencia pri zvýšenom tlaku škodcov alebo po výskyte prvých lariev/ dospelých škodcov. Aplikácia 2x po 7 – 10 dňoch. (Pri veľkom tlaku škodcov aplikáciu po 7 – 10 dňoch opakujeme).
Zemiak	Pásavka zemiaková	4 – 5 l / ha/ max. 1000 l vody	Po výskyte prvých lariev/ dospelých škodcov. Aplikácia každých 7 dní.
Poľné plodiny, zelenina, ovocné dreviny, vinič	Prezimujúci škodcovia v pôde	3 – 5 l / ha/ max. 1 000 l vody	Skorý jarný postrek na povrch pôdy.

Viac informácií
o produkte:



Mirato

Symbiotický účinok pôdných baktérií a mykorízy indukuje v rastline ochranné mechanizmy proti škodcom z čelade **Lepidoptera** a **Diptera**.

Mykoríza vyvoláva v rastline stimuláciu zhrubnutia bunkovej steny, predĺženia koreňov, produkciu kalusu a lignínu, ako aj produkciu antioxidantov, ako sú fytoalexíny a polyfenoly, ktoré pomáhajú endogénnej obrane rastliny.

Mikroorganizmy prípravku Mirato pomáhajú zneškodňovať larvy motýľov a dvojkrídlcov na hospodárskych plodinách ako aj okrasných rastlinách.

Pre lepšiu účinnosť je dôležité zabezpečiť dokonalé pokrytie celej rastliny prípravkom.

Formulácia : Kvapalina

Plodina	Škodca	Dávka	Aplikácia
Zelenina, vinič, ovocné dreviny, okrasné rastliny	Larvy <i>Lepidoptera</i> a <i>Diptera</i>	4 – 5 l/ ha	Podľa signalizácie každých 8 – 10 dní.
Obilniny		5 l/ ha	
Kukurica	Vijačka kukuričná	4 – 5 l/ ha	Počas kvitnutia
Rajčiak	<i>Tuta absoluta</i> (psota rajčiaková)	4 – 5 l/ ha	Podľa signalizácie 2 aplikácie po 6 dňoch

Viac informácií o produkte:



Righello

Prípravok s biologickou aktivitou pre riešenie ťažších problémov so škodlivým hmyzom.

Produkt obsahujúci spóry vybraných druhov a kmeňov baktérií používaných na aplikáciu do pôdy. Symbiotický účinok pôdných baktérií a mykorízy indukuje v rastline ochranné mechanizmy proti škodcom ako sú **drôtovc**, **kukuričiar**, **motýle**, **krtonožky**, **chrústy**, **smúťivky**, **strapky**, **molice**, **mravce**.

Mykoríza vyvoláva v rastline stimuláciu zhrubnutia bunkovej steny, predĺženia koreňov, produkciu kalusu a lignínu, ako aj produkciu antioxidantov, ako sú fytoalexíny a polyfenoly, ktoré pomáhajú endogénnej obrane rastliny.

Prípravok je vhodné použiť do pôdy skoro na jar pred siatím, kedy napomáha eliminovať všetkých prezimujúcich škodcov v pôde.

Formulácia : Kapsulované aktívne baktérie

Plodina	Škodca	Dávka	Aplikácia
Sadenice zeleniny a okrasných rastlín	Vajčka a larvy drôtovcov, motýľov, krtonožky, chrústov, smúťiviek, strapiek, molíc, mravcov	0,5 kg / m ³ substrátu	Zmiešať so substrátom pred siatím, presádzaním
Zelenina		20 – 25 kg/ha	Zapracovať do pôdy mikrogranulátora tesne pred siatím/ pri siatí.
Ovocné dreviny, vinič		20 – 25 kg/ha	Na jar po kvitnutí rozptýliť okolo koreňov
Obilniny, kukurica		15 – 20 kg/ha	Zapracovať do pôdy mikrogranulátora tesne pred siatím/ pri siatí.
Šalát	Mravce	10 kg/ha	Blízko hniezd

Viac informácií o produkte:



viac info na www.bacaro.eu